

Calendario vaccinale dell'infanzia

Vaccinazione	alla nascita	3° mese	5° mese	11° mese	12° mese	15° mese	3° anno	5-6 anni	11-12 anni	14-15 anni
Antidifterite-tetano-pertosse		DTP	DTP	DTP				DTP	DT	
Antipoliomielite		IPV	IPV	IPV			IPV			
Antiepatite B	HB ⁽¹⁾	HB	HB	HB					HB ⁽⁴⁾	
Antimorbillo-parotite-rosolia					MPR ⁽²⁾			MPR ⁽³⁾		
Anti-Haemophilus influenzae b		Hib	Hib	Hib						

HB - vaccino antiepatite B

DTP - vaccino antidifterite-tetano-pertosse

IPV - vaccino antipoliomielitico iniettabile - inattivato

MPR - vaccino antimorbillo-parotite-rosolia

DT - vaccino antidifterico-tetanico per adulti, contenente soltanto 2 Lf di anatossina difterica

Hib - vaccino anti-Haemophilus influenzae b

(1) Nei bambini nati da madri positive per HBsAg, da somministrare entro 12-24 ore, contemporaneamente alle immunoglobuline specifiche antiepatite B; il ciclo va completato da una seconda dose a distanza di 4 settimane dalla prima, da una terza dose dopo il compimento della ottava settimana e da una quarta dose in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita, in concomitanza con le altre vaccinazioni.

(2) E' possibile la somministrazione simultanea, in un'unica seduta vaccinale, delle vaccinazioni antidifterico-tetanica-pertossica, antiepatite virale B, antipoliomielitica ed antimorbillo-parotite-rosolia, anticipando quest'ultima al dodicesimo mese di vita. Qualora non sia stato possibile somministrare una dose di vaccino MPR entro i 24 mesi di vita, è necessario utilizzare ogni seduta vaccinale successiva per il recupero dei soggetti non vaccinati.

(3) L'offerta attiva della seconda dose di routine della vaccinazione antimorbillo-parotite-rosolia è epidemiologicamente importante soltanto dopo il raggiungimento di coperture vaccinali pari o superiori all'80 % nella popolazione bersaglio (bambini di età inferiore a 24 mesi di vita).

(4) Ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165, per gli adolescenti non precedentemente vaccinati.